~~n° 146 deux pièces~~ 1

Observation sur un étranglement de l'instestin à la suite d'une Operation de Hernie

n° 94.

Puisque l'experience est le flambeau de la Chirurgie & le guide assuré de la vaine Theorie, pourquoi se pavaner de la gloire de ses succès, sans publier ses non reussites; de Grands Maitres n'ont pas rougi de les transmettre à la posterité, persuadés qu'ils feroient plus d'impression & se rendoient plus recommandables en expliquant la raison imprevüe qui avoit fait échouer telle ou telle operation, ou en avouant même leurs fautes. Depouillé du sentiment de cette fausse honte je viens faire le narré d'une Operation de Hernie, qui a été suivie de la mort du sujet & contribuer à l'etablissement d'un precepte pour les cas semblables.

Mons.r De fernex agé de 36 ans & d'une bonne constitution, étoit incommodé depuis son enfance d'une Hernie pour laquelle on avoit employé infructueusement les applications fortifiantes & les bandages, dès qu'il les quittoit la descente reparoissoit, il s'en inquietoit peu par la facilité qu'il avoit d'y remedier lui même.

Un jour à la suite d'un ouvrage forcé il sentit l'instestin passer sous le bandage, ses efforts pour le replacer furent en pure perte, il passa la nuit à renouveller les tentatives & prévoyant le danger de son état, il me manda le lendemain matin, A mon arrivée je trouvai le pouls petit, serré, le scrotum étoit extremement tendu & douloureux, le malade commencoit à vomir, trois saignées raprochées calmerent un peu la violence

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ARC 15 d. 88 n° 1

des Simptômes, on lui donna de deux en deux heures des lavemens d'abord Simples, puis rendus purgatifs tantôt par le Savon tantot par le Sel de Glauber; les embrocations d'huile Sur le ventre & les Cataplasmes d'eau végétominerales furent emploiés, le malade Suppleoit à Sa boisson par quelques tranches d'oranges douces, enfin dans la journée je fis plusieurs tentatives pour reduire la Hernie, mais ce fut inutilement; pour abreger je rapporterai que j'emploïais les remedes connus en pareils cas, Si l'on en excepte la glace & les lavemens d'infusion de tabac, en avouant que je n'ose les emploier dans les Hernies aussi volumineuses & accompagnees d'autant de Symptômes inflammatoires.

Environ quarante Six heures après l'étranglement je procedais à l'operation, l'incision S'etendoit depuis un pouce au dessus de l'anneau jusqu'au bas du Scrotum les feuillets cellulaires separés & le sac ouvert dans sa partie inferieure, j'essayai de le fendre jusqu'à l'arcade crurale, mais je fus arreté par l'etranglement du péritoine qu'avoit occasionné la pression des bandages portés pendant trente ans, je ne pourrois exprimer la difficulté que j'eprouvai à couper cet étranglement, qui etoit recouvert par l'intestin lui même, dilaté par l'air rarefié qu'il renfermoit; aucune Sonde, aucun Stilet ne pouvoit passer Sous cette arcade; ce qui fit que je n'insistai point & abandonnai ce moyen qui me paroissoit dangereux & même impraticable j'eus recours au bistouri émoussé à Sa pointe, je le portai Sur mon ongle qui me Servoit de Conducteur & la Section S'en fit

avec Succès, malheureusement cet obstacle n'etoit pas le
Seul à Surmonter, l'intestin Se trouvoit adhérent à
l'épiploon par plusieurs points de Sa Surface & ce fut aux
dépens, de cette membrane qu'il en fut Séparé. Ces deux
Choses faites, je débridai l'anneau toujours avec ce même
bistouri, dont on ne Sauroit trop recommander l'usage pour cette
partie de l'opération, cet instrument étant à mon avis
infiniment préferable à tous les autres bistouris dont on se sert
communément en pareil cas, puisqu'on ignore qu'elles
parties ont peut blesser en les introduisant & celles qu'on
peut couper en les mettant en action.

Ensuite de cette opération je retirai une partie abdomi=
nale de l'intestin pour reconnoitre Son état, je le trouvai très
Sain, mais comme celui qui avoit été étranglé me paroissoit
extremement gangrené quoique Sans ouverture, je craignis
de le confier aux soins de la Nature en l'introduisant dans
le bas ventre, Sans avoir au préalable passé une aiguille
dans le mésentère vis avis la partie qui étoit la plus
malade afin de la fixer par l'anse du fil près de l'anneau
{A} de sorte que s'il Se fut Separé une eschare comme je le
presumois, l'intestin eut pû contracter plus facilement
de fortes adhérences; je le reduisis aussitôt; puis passant à
l'épiploon je le trouvai intimement uni à la parois interne
{A} Ce qui est contraire à ma pratique ordinaire, mais pendant une
operation l'on est déterminé Souvent par un certain je ne sais quoi,
produit de la réflexion du moment, à prendre des precautions inutiles
dans la crainte d'ometre quelque chose, qui nuise à Son Succès je ne voiois
aucun danger à passer un fil dans le mésentère & j'etois autorisé par
l'expérience qui dicte ce precepte dans les Hernies ou l'intestin est ouvert.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

du sac & chose rare, accompagné de beaucoup d'hydatides en chapelet dont la plus grosse n'excédoit pas le volume d'une noisette, je retranchai sans ligature ce paquet épiploïque, & j'appliquai un appareil convenable.

Le malade fut saigné peu après, l'on continua les embroca=tions huileuses & je prescrivis une potion adoucissante, il se trouvoit assez bien quoique fatigué par la longueur de l'operation; les vomissemens avoient cessé, & il eut une selle environ quatre heures après, dès lors rempli d'esperances je crus mon Patient sauvé, mais bientôt les choses changerent de face, environ six heures après l'évacuation, le pouls se concentra & les vomissemens recommencérent, je le fis saigner sur le champ & réflechissant sur la cause de ce nouvel accident je ne savois à quoi l'attribuer, seroit ce me disois-je une rupture de l'intestin? Mais les vomissemens ne subsisteroient pas, il se seroit fait un épanchement dont je trouverois des marques sous l'appareil que j'avois levé dans ce dessein. seroit-ce un autre étranglement dans le peritoine? Cela ne me paroissoit pas possible, ayant passé l'index dans l'anneau après sa délatation, seroit ce l'anse de la ligature? Mais j'avois eu soin de la laisser très lache, & en avoit fixé un bout dans le haut de la playe & l'autre dans le bas afin qu'elle ne put serrer, seroit-ce enfin l'épiploon? Mais son irritation, si toute fois, il en est susceptible, ne sauroit produire de semblables accidens. Baloté par ces idées & ne pouvant asseoir mon diagnostic sur rien de positif, j'eus recours aux saignées repétées & aux pilules faites avec l'extrait de Kina

le Camphre & l'opium, présumant que ce Changement
pouvoit être dû à un spasme du tube intestinal. Toutes
mes précautions & mes remèdes furent inutiles, le malade
périt dans l'Angoise la plus douloureuse environ trente
six heures après l'opération. Il m'étoit souvent venu
dans l'Idée de retirer la portion d'intestin contenuë dans
l'anse, mais réfléchissant à son mauvais état & aux
adhérences qu'il pouvoit avoir contracté avec les parties
voisines, je n'osois le faire, cependant c'étoit le seul
moyen qui eut pû conserver la vie à ce malade, comme
cela s'est vérifié. Il se trouvera peut être des personnes
qui blameront ma timidité réflechie, mais elle se trouvoit
authorisée par les Circonstances & ma seule réponse sera
de mettre mes Censeurs auprès du lit d'un pareil
malade.

Je demandai aux Parens du défunt avec empressement
l'ouverture du cadavre, ils me l'accorderent, avant tout
je convoquois un de mes Confréres qui avoit assisté à
l'Opération & un Medecin, pour être temoins d'un
incident si désagreable pour moi, le bas ventre étant
ouvert avec la plus grande circonspection, je trouvois
l'intestin Ileon qui avoit formé la Hernie assez générale-
-ment phlogosé, la partie comprise autour de l'anse très
gonflée, & tenant au peritoine par plusieurs points, elle etoit
aussi livide qu'au moment de l'opération, mais sans
crevasses, environ trois pouces au delà de l'ance, la partie
saine de l'intestin étoit repliée sur la partie enflammée

ARC 15 d. 88 n 1 a

& avoit contracté des adhérences assés fortes pour le tems qui s'etoit passé depuis l'Operation, de sorte que les excrémens parvenoient facilement jusqu'à ce pli, mais ne pouvoient pas absolument aller plus loin quelques liquides qu'ils eussent pû être ce qui nous devoila la cause du retour des vomissemens & de la mort du Sujet. Je trouvois en outre un foyer purulent, dans la partie lombaire & hypogastrique du côté où se trouvoit l'épiploon

Genève 16 Avril 1785 Jurine Ch.